

**Tricholoma pardinum (Pers.) Quél.**



Atigrado, falsa negrilla

© Miguel Ángel Ribes

**Tricholoma terreum (Schaeff.) P. Kumm.**



Negrilla, ratón

© Miguel Ángel Ribes

**Tricholoma portentosum (Fr.) Quél.**



Capuchina, seta de charol

© Miguel Ángel Ribes

|                      | <b>Tricholoma pardinum</b>  | <b>Tricholoma terreum</b>                    | <b>Tricholoma portentosum</b>                                      |
|----------------------|---|--|--|
| <b>Sombrero</b>      | 4-15 cm, con escamas más o menos concéntricas   | 2-6 (8) cm, escamoso a seríceo, no viscoso   | 4-15 cm, radialmente fibriloso, viscoso en tiempo húmedo           |
| <b>Pie</b>           | Blanquecino, tendencia a pardear, robusto y resistente  | Blanco grisáceo, no pardea, esbelto y frágil | Blanco amarillento, no pardea, robusto y resistente                |
| <b>Láminas</b>       | Blancas, algo crema grisáceas en la madurez   | Blanco grisáceas a grises                    | Blanco amarillentas, con tendencia rosada o grisácea en la madurez |
| <b>Observaciones</b> | <i>Tricholoma pardinum</i> es fácil de confundir con muchas otras especies parecidas a <i>T. terreum</i> , por ejemplo <i>T. bonii</i> , <i>T. triste</i> , <i>T. sculpturatum</i> , <i>T. inocybeoides</i> , etc., y también con el grupo de <i>T. orirubens</i> , <i>T. atosquamosum</i> , etc. |  |  |